

〔症例〕

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用			
	性・ 年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置			
1	女 30代	逆流性食道炎 (なし)	20mg 1日間 ↓ 中止	<p>アナフィラキシー 既往歴，患者の体質等：なし</p> <p>投与開始日 数週間前より胸やけあり，他院にて胃カメラ検査を実施。逆流性食道炎と診断され，本剤就寝前で処方され，同日服用した。</p> <p>投与中止1日後 前日に本剤服用した3時間後からそう痒，嘔気症状あり（アナフィラキシー），救急外来受診。全身紅潮，血圧低下（87/57），SPO<sub>2</sub> 98%，アナフィラキシーショックとして，アドレナリン0.3mg筋注，入院。前日の投与をもって本剤中止。メチルプレドニゾン125mg/日，点滴加療（2日間）。</p> <p>不明日 全身そう痒持続，大腿部紅疹。</p> <p>投与中止3日後 症状軽快し，退院。</p> <p>不明日 退院後，DLST検査を実施し，本剤272cpm（+），コントロール114cpm。 退院以来来院していない。</p>			
臨床検査値							
			投与開始日 (投与中止日)	投与中止 1日後	投与中止 3日後	投与中止 10日後	不明日
	WBC (μL)		16,100	—	8,400	6,249	—
	リンパ球		3,139	—	1,537	1,277	—
	LD (u/L)		300	—	203	182	—
	AST (IU/L)		36	—	15	13	—
	CRP (mg/dL)		0.06	—	0.75	0.2	—
	血圧		—	87/57	—	—	—
	SPO <sub>2</sub> (%)		—	98	—	—	—
	DLST (cpm)：本剤		—	—	—	—	272(+)
	DLST (cpm) ：コントロール		—	—	—	—	114
併用被疑薬：なし 併用薬：なし							