

[症例概要]

No.	被接種者		1日接種量 接種期間	副反応				
	性・ 年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置				
1	女 1歳 未満	ロタウイルス による胃腸炎 の予防 (なし)	1.5mL (4週間以上 の間隔を おいて2回 経口接種)	<p>アナフィラキシー反応 接種前の体温：37度3分 予診票での留意点（基礎疾患，アレルギー，最近1ヶ月以内のワクチン接種や病気，服薬中の薬，過去の副作用歴，発育状況等）はなし</p> <p>接種日 併用被疑ワクチンを接種後，本ワクチン（1回目）接種中に，身体の発疹，喘鳴が始まった。やや元気が無くなり，聴診上喘鳴を聴取。SpO2は94～97%と不安定だった。アナフィラキシーと考え病院に搬送した。 病院の救急外来受診。来院時診察では，症状はピークを越え，皮疹もほぼ消失してきていた。2時間ほど経過を見て再燃がないことを確認して帰宅とした。</p>				
<p>臨床検査値</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>接種後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>酸素飽和度 (%)</td> <td>94～97</td> </tr> </tbody> </table>						接種後	酸素飽和度 (%)	94～97
	接種後							
酸素飽和度 (%)	94～97							
<p>併用被疑ワクチン：乾燥ヘモフィルスb型ワクチン（破傷風トキソイド結合体），沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体），組換え沈降B型肝炎ワクチン（酵母由来） 併用薬：なし</p>								