

〔症例概要〕

No.	患者		1 日投与量 投与期間	副作用																																																								
	性・ 年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置																																																								
1	男 80代	肝細胞癌 (高血圧, うっ 血性心不全, 認知症)	400mg 3日間	腫瘍崩壊症候群 投与開始日 肝細胞癌に対して本剤投与開始。 投与 3 日目 腫瘍崩壊症候群が発現。 (投与中止日) カリウム:6.3mEq/L, 尿素窒素:58mg/dL, 無機リン:5.4mg/dL, 尿酸:11.2mg/dLに上昇。本剤投与中止し, アロプリノール100mg, 補液負荷2000mL/日, フロセミド40mg/日投与開始。 中止 1 日後 急性膵炎が発現。 ナファモスタットメシル酸塩30mg/日投与開始。 CT検査 (胸部～骨盤[単純]): 肝右葉の肝細胞癌に大きな変化認めず。 中止 2 日後 ナファモスタットメシル酸塩を60mg/日に増量。炭酸水素ナトリウム40mL追加投与。 中止 7 日後 腹部超音波検査 (肝臓): 辺縁鈍化, 表面平滑であり, 内部に粗雑な印象は乏しい。肝右翼に直径70mm大の高低輝度混在の腫瘍を認める。CTと比較し, 大きさの著変はないが, 低輝度の領域は壊死が疑われる。 中止 8 日後 腫瘍崩壊症候群は回復。補液投与終了。 中止15日後 急性膵炎は軽快。																																																								
臨床検査値																																																												
<table><tr><th>検査項目 (単位)</th><th>投与 1 日前</th><th>投与 3 日目 (発現日/中止日)</th><th>中止 1 日後</th><th>中止 8 日後</th></tr><tr><td>尿素窒素 (mg/dL)</td><td>39</td><td>58</td><td>58</td><td>17</td></tr><tr><td>クレアチニン (mg/dL)</td><td>1.46</td><td>1.87</td><td>1.75</td><td>1.44</td></tr><tr><td>尿酸 (mg/dL)</td><td>9.2</td><td>11.2</td><td>11.2</td><td>5.5</td></tr><tr><td>ナトリウム (mEq/L)</td><td>139</td><td>139</td><td>132</td><td>122</td></tr><tr><td>カリウム (mEq/L)</td><td>5.4</td><td>6.3</td><td>5.1</td><td>4.5</td></tr><tr><td>カルシウム (mg/dL)</td><td>8.9</td><td>9.0</td><td>8.6</td><td>-</td></tr><tr><td>無機リン (mg/dL)</td><td>3.9</td><td>5.4</td><td>4.8</td><td>-</td></tr><tr><td>アミラーゼ (IU/L)</td><td>118</td><td>225</td><td>1541</td><td>360</td></tr><tr><td>P型アミラーゼ (IU/L)</td><td>41</td><td>167</td><td>1526</td><td>-</td></tr><tr><td>リパーゼ (IU/L)</td><td>56</td><td>446</td><td>4190</td><td>-</td></tr></table>						検査項目 (単位)	投与 1 日前	投与 3 日目 (発現日/中止日)	中止 1 日後	中止 8 日後	尿素窒素 (mg/dL)	39	58	58	17	クレアチニン (mg/dL)	1.46	1.87	1.75	1.44	尿酸 (mg/dL)	9.2	11.2	11.2	5.5	ナトリウム (mEq/L)	139	139	132	122	カリウム (mEq/L)	5.4	6.3	5.1	4.5	カルシウム (mg/dL)	8.9	9.0	8.6	-	無機リン (mg/dL)	3.9	5.4	4.8	-	アミラーゼ (IU/L)	118	225	1541	360	P型アミラーゼ (IU/L)	41	167	1526	-	リパーゼ (IU/L)	56	446	4190	-
検査項目 (単位)	投与 1 日前	投与 3 日目 (発現日/中止日)	中止 1 日後	中止 8 日後																																																								
尿素窒素 (mg/dL)	39	58	58	17																																																								
クレアチニン (mg/dL)	1.46	1.87	1.75	1.44																																																								
尿酸 (mg/dL)	9.2	11.2	11.2	5.5																																																								
ナトリウム (mEq/L)	139	139	132	122																																																								
カリウム (mEq/L)	5.4	6.3	5.1	4.5																																																								
カルシウム (mg/dL)	8.9	9.0	8.6	-																																																								
無機リン (mg/dL)	3.9	5.4	4.8	-																																																								
アミラーゼ (IU/L)	118	225	1541	360																																																								
P型アミラーゼ (IU/L)	41	167	1526	-																																																								
リパーゼ (IU/L)	56	446	4190	-																																																								
併用薬:プロチゾラム, ドネペジル塩酸塩, アセチルサリチル酸, バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤, アムロジピンベシル酸塩, メチルジゴキシン, ビタバスタチンカルシウム, 硝酸イソソルビド, フロセミド, ランソプラゾール, レバミピド, イコサペント酸エチル																																																												